



FICHA TÉCNICA DE BRASINOFORTE 0.205 EW (BIO SHOT en EE. UU.)

Fabricante y formulador:	Ag BioTech, Inc. P.O. Box 636, Lakeville, NY. EE. UU. 14480, +1-585-455-0331, www.agbioinc.com
Nombre en América Latina:	Brasinoforte 0.205 EW
Nombre en EE. UU.:	Bio Shot
Clasificación por uso:	Bioestimulante o Regulador de Crecimiento
Estado Físico:	Líquido
Formulación:	Emulsión Acuosa Concentrada (EW)
Categoría toxicológica:	5, banda verde
Antídoto:	No existe. Dar tratamiento sintomático.
Síntomas de intoxicación:	Si hay contacto con los ojos se puede presentar leve irritación. Lávelos con agua limpia por 15-20 minutos y si persiste lleve al médico con etiqueta o panfleto. Use pantalón largo y camisa mangas largas, y, cuando aplique a objetivos altos, use mascarilla o protector de ojos.

Ingredientes	% p/p	% p/v
1-Triacontanol	0.200	0.200
Brasinoesteroides	0.005	0.005
Ingredientes inertes	99.795	97.335

Densidad: 0.9754

Recomendaciones de uso y dosis:

Se recomiendan 2 a 4 aplicaciones, según cultivos: una en la siembra, que puede ser de varias formas: en granos y cereales por tratamiento de semilla, mezclando en mezcladora de concreto, bolsa o sobre manta una solución de Brasinoforte a 25 mL más el mínimo de agua para buen cubrimiento de las semillas para una hectárea y dejarlas secar sólo para no atorar la sembradora, o hasta bien secas, para evitar germinación y hongos, si se almacenará por más tiempo, o por aspersión sobre las semillas en el surco con mochila o sembradora con aditamento, antes del tape, a 100-150 ml/ha; en hortalizas por inmersión de raíces en solución a 0.05-0.1% v/v, inmediatamente antes del trasplante; en siembra de árboles mediante “drench” o remojo de raíces y suelo con solución de Brasinoforte a 1 ml por árbol diluida en suficiente agua; y en todos los cultivos mediante sistemas de riego, a 100-150 mL/ha. Aplicaciones desde crecimiento hasta fructificación preferiblemente por aspersión sobre hojas y suelo, en intervalos de 20-60 días, según cultivos, a 100-150 ml/ha (cultivos de menor valor, como granos-cereales, a 100 mL/ha, y los de mayor valor, como hortalizas/vegetales y árboles-arbustos frutales (cítricos, aguacate, frutillas), a 150 mL/ha).

Período de carencia: Después de secarse sobre el follaje (1 hora). Si se aplica con otros productos, ver período de carencia del otro producto.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Compatibilidad: Brasinoforte se puede mezclar con todos los productos agroquímicos herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes.

Almacenamiento: El producto no es inflamable, explosivo ni corrosivo. Almacene en su recipiente original, sellado, en lugar fresco y seco, hasta 2 años, a temperatura entre 4 y 40 °C.