



FICHA TÉCNICA DE BIOCORT BRASINOFORTE 0.306 EW

Empresa fabricante y formulador:	Ag BioTech, Inc., P.O. Box 636, Lakeville, NY. EE. UU. 14480, +1 5854550331, https://agbioinc.com/
Empresa importadora-distribuidora en Guatemala:	Cortazar S.A., km 22.5 Carretera a El Salvador, Ecoplaza Ofibodega 203, Fraijanes, Guatemala 01062, PBX: +502 66714242, mynor.zuniga@cortazarinternacional.com
Nombre en país de origen (EE.UU.):	Bio Shot
Clasificación en GT:	Sustancia Afín a Plaguicidas
Uso recomendado en GT:	Regulador de Crecimiento, Sinergista
Estado Físico:	Líquido
Formulación en GT:	Emulsión Aceite en Agua (EW)
Categoría toxicológica en GT:	5, Verde, Atención
Antídoto:	No existe. Dar tratamiento sintomático.
Síntomas de intoxicación:	Si hay contacto con los ojos se puede presentar leve irritación. Lávelos con agua limpia por 15-20 minutos y si persiste lleve al médico con etiqueta o panfleto. Use pantalón largo y camisa mangas largas, y, cuando aplique a objetivos altos, use mascarilla o protector de ojos.

Ingredientes	% p/v
1-Triacontanol	0.300
14-hidroxilado brasinoesteroide	0.006
Ingredientes inertes	97.234

Recomendaciones de uso y dosis:

Se recomiendan 2 a 4 aplicaciones, según cultivos: una en la siembra, que puede ser de varias formas: en granos y cereales por tratamiento de semilla, mezclando en mezcladora de concreto, bolsa o sobre manta una solución de Brasinoforte a 18 mL/mz (25 mL/ha) más el mínimo de agua para buen cubrimiento de las semillas y dejarlas secar, sólo para no atorar la sembradora, o hasta bien secas, si almacenar por más tiempo (evitando germinación y hongos), o, por aspersión sobre las semillas en el surco, con mochila o sembradora con aditamento, antes del tape, a 70-100 ml/mz (100-150 ml/ha); en hortalizas por inmersión de raíces en solución a 0.05-0.1 % v/v, inmediatamente antes del trasplante; en siembra de árboles mediante “drench” o remojo de raíces y suelo con solución de Brasinoforte a 1 ml/árbol diluida en agua; y en todos cultivos mediante sistemas de riego, a 70-100 ml/mz (100-150 ml/ha). Aplicaciones desde crecimiento hasta fructificación se recomiendan preferiblemente por aspersión sobre hojas y suelo, en intervalos de 20-60 días, según cultivos, a 70-100 ml/mz (100-150 ml/ha) las dosis menores dentro del rango citado en cultivos de menor valor, como granos y cereales, y las dosis mayores en cultivos de mayor valor, como hortalizas o vegetales y árboles-arbustos frutales.

Período de carencia: Después de secarse sobre el follaje (1 hr.). Si se aplica con otros productos, ver período de carencia del otro producto.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

Compatibilidad: Brasinoforte se puede mezclar con todos los productos agroquímicos herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes.

Almacenamiento: El producto no es inflamable, explosivo ni corrosivo. Almacene en su recipiente original, sellado, en lugar fresco y seco, hasta 2 años, a temperatura entre 4 y 40 °C.